

第2類醫藥品

整腸藥 クレンジル

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)
哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑時請避免哺乳

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 有藥物過敏史者
 - 身體虛弱者(體力衰退者、身體較弱者)
 - 胃腸虛弱易腹瀉者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

- 服用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
腹瀉
- 若服用2週左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

便秘、清腸(調整通便)、軟便、胃部、腹部脹感、食慾不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、吃太多(過量)、喝太多(過飲)、心口灼痛、胃下垂、胸悶、想吐(反胃、宿醉、大醉帶來的反胃、乾嘔、噁心)、嘔吐

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人(15歲以上)	3顆膠囊	3次
11歲以上未滿15歲	2顆膠囊	
未滿11歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下使用

成分、含量

每天用量（9 顆膠囊）中

野梧桐萃取物	0.5 g（原草藥換算量 5 g）
中日老鸛草萃取物	0.2 g（原草藥換算量 2 g）
蘆薈粉末	0.15 g
大黃萃取物	20 mg（原草藥換算量 0.2g）
藥用炭	0.4 g

添加物：羥丙基纖維素、玉米澱粉、纖維素、磷酸氫鈣、滑石、交錯羧甲基纖維素鈉、二氧化矽、紅花籽油、甲基丙烯酸共聚物 L、明膠、月桂醇硫酸鈉

- 本劑使用了天然藥物（生藥），膠囊內容物顏色多少會有所差異。另外，本劑中可能出現白色斑點，是由於添加物所引起。
- 由於藥用炭等有效成分有可能導致大便顏色改變，無需擔心

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 有可能出現鋁袋及 PTP 板收縮的現象，但不影響產品品質

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>