

## 第2类医药品

皮肤・湿疹外用薬 **キュアレア a**

販売名: キュアレア a

## 使用注意事項

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商(1) 正在接受医生治疗的人

- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 患部不干爽及溃烂严重的人

## 2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

| 相关部位 | 症状                          |
|------|-----------------------------|
| 皮肤   | 皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺激感（刺痛感）、热感、干燥感 |

## 3. 若使用1~2周左右后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

湿疹、皮炎、瘙痒、接触性皮炎、溃烂、汗疹、尿不湿接触性皮炎

## 用法、用量

请每天数次，取适量涂抹于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用
- (4) 请清洁患部后涂抹

## 成分、含量

100g 中

| 成分   | 含量   | 作用  |
|------|------|---|
| 乌芬那酯 | 5g   | (抗炎成分) 皮肤刺激作用小, 非类固醇类抗炎成分直接作用于患部, 消除发红、炎症 |
| 苯海拉明 | 1g   | (抗组胺成分) 抑制瘙痒的发生                           |
| 甘草酸  | 0.3g | (抗炎成分) 消除发红、炎症                            |

辅料: 2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱·甲基丙烯酸丁酯共聚物、石蜡油、甘油、1,3-丁二醇、硬脂醇、硬脂酸酯、矽士林、硬脂酸甘油酯、黄原胶、二甲聚硅氧烷、胆固醇、对羟基苯甲酸酯、依地酸二钠、硬脂酸钾、pH 调节剂

## 保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后, 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中 (可能造成误用或者变质)

销售商 小林制药株式会社  
 大阪市中央区道修町 4-4-10  
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>