

## 第2类医药品

皮肤外用薬 **キュアレアドライ**

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

下列人群请勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板减少症、紫斑病等)的人
- (2) 即使极少量的出血也有可能引起严重后果的人(具有抑制血液凝固的作用, 有可能促进出血)
- (3) 特应性皮炎患者(即便症状轻微, 但根据医生的诊断, 需要接受适当治疗)

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 有药物过敏史的人
  - (3) 患部不干爽和溃烂严重的人
  - (4) 曾被医生诊断为特应性皮炎的患者
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

手指的皲裂、手肘、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症、手脚的开裂与龟裂、干皮病、幼儿的干性皮肤、冻伤(溃烂除外)、伤口及烧伤后的皮肤硬结、紧绷(面部除外)、挫伤与扭伤后的肿胀、肌肉痛、关节痛

## 用法、用量

请每天1~数次, 取适量涂于患部或涂抹在纱布等上后贴于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用水或者温水清洗。此外, 如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
- (3) 本品仅限外用

**成分、含量** 100g 中

成分	含量
类肝素	0.3g
苯海拉明	0.5g
$\gamma$ -谷维素	1.0g

辅料：凡士林、角鲨烷、液体石蜡、肉豆蔻酸异丙酯、二甲聚硅氧烷、1,3-丁二醇、丙二醇、2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱·甲基丙烯酸丁酯共聚物、N-(十六烷氧基羟丙基)-N-羟乙基十六酰胺※、鲸蜡醇、硬脂醇、聚山梨醇酯 60、自乳化型硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯硬化蓖麻油、羧乙烯基聚合物、依地酸钠、对羟基苯甲酸酯、三乙醇胺、pH 调节剂

**保管及使用注意事项**

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
  - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
  - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
  - (4) 请勿靠近火源
- 请注意如果沾染在衣物上，少数情况下会使衣物发黄

销售商：小林制药株式会社  
大阪市中央区道修町 4-4-10  
主页：<https://www.kobayashi.co.jp>