

第2類醫藥品

皮膚外用藥

キュアレアドライ

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

下列人士請勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板減少症、紫斑病等）者
- (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者（因血液凝固抑制作用而有增進出血的可能）
- (3) 異位性皮膚炎者（即使症狀輕微，也需要在醫師指示下接受適當治療）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 對藥物曾有過敏反應者
 - (3) 皮膚潮濕和潰爛嚴重者
 - (4) 醫師診斷患有異位性皮膚炎者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子與發紅、發癢、腫脹

3. 如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

手指的乾燥、手肘・膝蓋・腳後跟・腳踝的角化症、手腳皮膚裂開及龜裂、乾皮症、幼兒的乾燥性皮膚、凍傷（潰爛除外）、受傷與燒傷後的皮膚硬塊、突起（臉部除外）、撞傷與扭傷後的腫脹・肌肉痛・關節痛

用法、用量

請每天使用 1~數次，在患部上適量塗抹，或塗在紗布上後貼上

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅供外用

成分、含量	
100g 中	
成分	含量
類肝素	0.3g
苯海拉明	0.5g
γ -穀維素	1.0g

添加物：凡士林、角鯊烷、液態石蠟、肉豆蔻酸異丙酯、聚二甲基矽氧烷、1,3-丁二醇、丙二醇、2-甲基丙烯酸氧乙基磷酸膽碱・甲基丙烯酸丁酯共聚物、N-(十六烷氧基羥丙基)-N-羥乙基十六烷酰胺※、鯨蠟醇、硬脂醇、聚山梨醇酯 60、自己乳化型硬脂酸甘油酯、聚氧乙稀氫化蓖麻油、羧乙烯基聚合物、依地酸鈉、對羥基苯甲酸酯、三乙醇胺、pH 調節劑

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊蓋子，保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請避免接近火源
- 沾染到衣物上，偶有會讓衣物發黃的現象，請充分注意

銷售商：小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>