

第2类医药品

中药制剂 **ダスモック b (錠剤)**

販売名: ダスモック b

## 使用注意事項

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 胃肠虚弱的人
  - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状
肠系膜静脉硬化性肠炎	因长期服用而反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀等症状

- 若服用约1个月后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

体力中等程度，咳嗽不止，痰多且难以咳尽的以下症状：咳嗽时带有大量的痰、支气管炎

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15岁以上)	5片	2次
不满15岁	×	不可服用

### <用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
  - (2) 本品易受潮，每次服用后请务必盖紧瓶盖
- 餐间意味着“两餐之间”，指饭后约2~3小时

### 成分、含量

每天剂量(10片)中

含清肺汤提取物 3.2g

<从以下中草药中提取>

黄芩	1.0g	桔梗	1.0g	桑白皮	1.0g
杏仁	1.0g	山栀子	1.0g	天门冬	1.0g
川贝	1.0g	陈皮	1.0g	大枣	1.0g
竹筴	1.0g	茯苓	1.5g	当归	1.5g
麦门冬	1.5g	五味子	0.25g	生姜	0.25g
甘草	0.5g	(辅料: 糊精)			

辅料: 二氧化硅, 交联羧甲基纤维素钠, 硅酸酐, 1-薄荷醇, 丙二醇, 硬脂酸镁, 香料

- 由于本品采用了天然物(中草药), 因此片剂的颜色会有少许差异

### 保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后, 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中(可能造成误用或者变质)
- (4) 请勿用湿手接触本品
- (5) 瓶中填充物用于防止运送时发生破损, 开封后请扔掉

销售商 小林制药株式会社  
大阪市中央区道修町 4-4-10  
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>