

第2類醫藥品

中藥製劑 **ダスモックb (錠劑)**

販売名：ダスモックb

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 胃腸虛弱者
 - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀
腸系膜靜脈硬化性大腸炎	因長期服用而反覆出現腹痛、腹瀉、便秘、腹脹等症狀

- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等程度，咳嗽不止、痰多且難以咳盡等之以下症狀：咳嗽時帶有大量的痰、支氣管炎

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人(15歲以上)	5錠	一天2次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

成分、含量

每天用量(10錠)中 含清肺湯萃取物 3.2g

<原生中藥換算量>

黃芩	1.0g	桔梗	1.0g	桑白皮	1.0g
杏仁	1.0g	山梔子	1.0g	天門冬	1.0g
川貝	1.0g	陳皮	1.0g	大棗	1.0g
竹筴	1.0g	茯苓	1.5g	當歸	1.5g
麥門冬	1.5g	五味子	0.25g	生薑	0.25g
甘草	0.5g (添加劑：含糊精)				

添加物：二氧化矽，交聯羧甲基纖維素鈉，無水矽酸，1-薄荷醇，丙二醇，硬脂酸鎂，香料

- 由於本產品採用了天然藥物（生藥），因此錠劑的顏色會有少許差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑
- (5) 瓶中的充填物是用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>