

止咳化痰药 **ダスマック SP**

販売名：ダスマック SPa

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应或事故)

## 1. 下列人群请勿使用

对本品或本品成分有过敏史的人

## 2. 服用本品期间, 请勿服用以下任何医药品

其他止咳化痰药、感冒药、镇静剂、含有抗组胺的口服药物等  
(鼻炎口服药、晕车药、过敏药等)

## 3. 服用后, 禁止驾驶或者进行机械类的操作

(可能会出现嗜睡)

## 咨询事项

## 1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
- (3) 有药物过敏史的人
- (4) 有以下症状的人：高热

## 2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振
精神神经系统	眩晕
呼吸系统	呼吸困难、气短

极少数患者会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

## 3. 服用后有可能出现下列症状, 如症状持续或加重, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

嗜睡

## 4. 若服用5~6次后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

咳嗽、痰

## 用法、用量

成人（年满 15 岁），一天服用 4 次，每次喷 3 次（按压 3 下）。

必要时，一天最多可服用 6 次。

无论哪种情况，都需间隔约 4 小时服用。

（15 岁以下请勿服用）

<用法与用量相关的注意事项>

- （1）请严格遵守规定的用法与用量
- （2）首次使用时务必空按 5 次（此时出来的药液不要服用）
- （3）本品并非直接适用于喉咙的医药品，应将药液朝舌头挤出并迅速服用，以免直接接触喉咙  
（在吸气时使用会使药液进入气管或肺部，因此使用时应轻轻呼气）
- （4）确保每次按压时将泵头按至底部
- （5）本品可服用 12 次（服用 12 次后，药液可能不足以满足单次用量，因此不要再服用）

## 成分、含量

一日剂量（6 次：9 mL）中

成分	含量
氢溴酸右美沙芬水合物	60 mg
愈创木酚磺酸钾	270 mg
桔梗提取物（原生药换算量：0.6 g）	0.6 mL

辅料：阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物）、安赛蜜钾、赤藓糖醇、乙醇、甘油、丙二醇、对羟基苯甲酸酯、1-薄荷醇、香料、柠檬酸、柠檬酸钠

## 保管及使用注意事项

- （1）请将瓶盖拧紧后，直立保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- （4）请勿服用过期产品

销售商：小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页：<https://www.kobayashi.co.jp>