

第2類醫藥品

止咳化痰藥 **ダスモック SP**

販売名：ダスモック SPa

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用及事故)

1. 下列人士禁用
 - 曾因本劑或本劑成分產生過敏反應者
2. 服用本劑期間，請勿服用以下任何醫藥品
 - 其他止咳化痰藥、感冒藥、鎮靜劑、含有抗組織胺的內服藥等
(鼻炎內服藥、暈車藥、過敏藥等)
3. 服用後，禁止開車或者進行機械類的操作
(會出現嗜睡感)

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 有藥物過敏史者
 - (4) 有以下症狀者：高燒
2. 服用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	眩暈
呼吸器官	呼吸困難、呼吸急促

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀

3. 服用後有可能出現下列症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
嗜睡
4. 服用5~6次後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

咳嗽、痰

用法、用量

大人 (年滿 15 歲)，1 天服用 4 次，每次噴 3 次 (按壓 3 下)。

必要時，1 天最多可服用 6 次

任何情況下皆必須間隔約 4 小時服用

(未滿 15 歲，請勿服用)

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 首次使用時，務必空按壓 5 下 (此時出來的藥水，請勿服用)
- (3) 本藥品並非直接適用於喉嚨的醫藥品，因此請對著舌頭壓出藥水，迅速服用，以免直接接觸喉嚨
(若是邊吸氣邊使用，藥水有進入支氣管和肺部之虞，因此請邊輕輕吐氣邊使用)
- (4) 每次按壓請將按壓頭按壓到底
- (5) 本商品可服用 12 次 (服用 12 次後，藥水可能不足 1 次服用量，因此請勿服用)

成分、含量

1 天量 (6 次 : 9 mL) 中

成分	含量
氫溴酸右美沙芬水合物	60 mg
癒創木酚磺酸鉀	270 mg
桔梗萃取物 (原生藥換算量 : 0.6 g)	0.6 mL

添加物：阿斯巴甜 (L-苯丙胺酸化合物)、乙醯磺胺酸鉀、赤藻糖醇、乙醇、甘油、丙二醇、對羥基苯甲酸酯、l-薄荷醇、香料、檸檬酸、檸檬酸鈉

保管與使用相關注意事項

- (1) 請在蓋緊瓶蓋後直立存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)
- (4) 超過使用期限的產品，請勿服用

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>