

第2類醫藥品

貧血用藥

ファイチ Beautiol (ビューティオール)

販売名：ファイチ Beautiol

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)
正在服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品
其他貧血用藥

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 有藥物過敏史者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐・嘔吐、食慾不振、胃部不適、腹痛

- 服用後有時會出現下列症狀，如果這些症狀一直持續或者加重，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：便秘、腹瀉
- 服用2週左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

貧血

用法、用量

請在飯後用水或溫水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	2 錠	1 天 1 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 服用前後 30 分鐘內請勿飲用茶、咖啡等飲料
- 本藥劑請搭配水或溫水服用，服用時請勿嚼碎

成分、含量

每天用量（2 錠）中

成分	含量
可溶性焦磷酸鐵	79.5mg
抗壞血酸（維生素 C）	50.0mg
醋酸 d- α -生育醇酯（維生素 E）	10.0mg
氰鈷胺（維生素 B12）	50 μ g
葉酸	1.0mg

添加物：玉米澱粉、二氧化矽、山梨醇月桂酸酯、明膠、白糖、滑石、脂肪酸甘油酯、纖維素、D-甘露醇、羥丙基纖維素、交聯羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂、羥丙基甲基纖維素鄰苯二甲酸酯、羥丙基纖維素、聚乙二醇、紅色 102 號、黃色 5 號

<成分與含量的注意事項>

- 服用本藥物會對尿液以及糞便的檢查值產生影響
- 接受醫生檢查時，請告知醫生正在服用含有維生素 C 的製劑
- 含有可溶性焦磷酸亞鐵，可能導致糞便變黑

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>