

第2类医药品

贫血用药 ファイチ

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

服用本品期间, 请勿服用以下药物

其他贫血用药

咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 孕妇或有妊娠可能的妇女
- (3) 有药物或化妆品等过敏史的人

2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适、腹痛

3. 服用后可能会出现以下症状, 如果这些症状持续或者加重, 请停止用药, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商: 便秘、腹泻

4. 若服用2周左右后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

贫血

用法、用量

请按以下剂量, 于餐后以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	2片	1天1次
8岁以上不满15岁	1片	
不满8岁	× 请勿服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 本品容易受潮，每次服用后请盖好瓶盖
- (3) 服用前后 30 分钟内请勿饮用茶水、咖啡等饮料
- (4) 幼儿请在监护人的监督指导下服用

●本品以水或温水送服，无需嚼碎

成分、含量

每日用量（2 片）中

可溶性焦磷酸铁 79.5mg

氰钴胺（维生素 B₁₂） 50ug

叶酸 2mg

辅料：乳糖、羟丙基纤维素、滑石、硬脂酸镁、邻苯二甲酸羟丙甲基纤维素酯、柠檬酸三乙酯、白砂糖、明胶、阿拉伯树胶、氧化钛、碳酸钙、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇、红色 102 号、巴西棕榈蜡

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 为保证质量，请使用瓶盖倒取片剂，用手触摸过的片剂请勿放回瓶中
- (5) 瓶中填充物用于防止药剂在运送时受损，开封后时请丢弃
- (6) 请勿服用干燥剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>