

## 第2類醫藥品

貧血用藥 **ファイチ**

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)  
正在服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品  
其他貧血用藥

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 有藥物過敏史者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀                 |
|------|--------------------|
| 皮膚   | 長疹子和發紅、發癢          |
| 消化器官 | 想吐・嘔吐、食慾不振、胃部不適、腹痛 |

- 服用後有時會出現下列症狀，如果這些症狀一直持續或者加重，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：便秘、腹瀉
- 服用2週左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

貧血

## 用法、用量

請在飯後用水或溫水服用，用量如下

| 年齡        | 單次劑量   | 每天服用次數 |
|-----------|--------|--------|
| 成人(15歲以上) | 2錠     | 1天1次   |
| 8歲以上未滿15歲 | 1錠     |        |
| 未滿8歲      | × 不可服用 |        |

### <用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
  - (3) 服用前後 30 分鐘內請勿飲用茶、咖啡等飲料
  - (4) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用
- 本藥劑請搭配水或溫水服用，服用時請勿嚼碎

### 成分、含量

每天用量（2 錠）中

可溶性焦磷酸鐵.....79.5mg

氰鈷胺（維生素 B12）.....50ug

葉酸.....2mg

添加物：乳酸、羥丙基纖維素、滑石、硬脂酸鎂、羥丙基甲基纖維素鄰苯二甲酸酯、檸檬酸三乙酯、白糖、明膠、阿拉伯膠、氧化鈦、碳酸鈣、聚氧乙烯聚氧丙二醇、紅色 102 號、巴西棕櫚蠟

### 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 為了保持品質，取出錠劑時請放在瓶蓋裡，用手觸摸過的錠劑請勿放回瓶中
- (5) 瓶中的充填物是用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉
- (6) 請勿服用容器內的乾燥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>