

第2类医药品

止痒消炎药 フェミニーナジェル

販売名：フェミニーナ J

使用注意事项

本品并非念珠菌病的治疗药。请勿与Feminina 阴道念珠菌片等念珠菌病治疗药一同使用

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用: 念珠菌病患者
2. 请勿用于下列部位: 眼睛周围、粘膜等

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 有药物等过敏史的人
 - (4) 患部不干爽、溃烂严重的人
 - (5) 婴幼儿
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

瘙痒、接触性皮炎、湿疹、虫咬、皮炎、荨麻疹、汗疹、溃烂、冻疮

用法、用量

请每天数次, 取适量本品涂于患处

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 儿童请在监护人的监督指导下使用
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗

(3) 本品仅限外用

- 同一部位请勿同时使用其他外用剂
- 请勿在患部及其周围不清洁的情况下使用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
利多卡因	2.0 g	(局部麻醉成分) 快速止痒
苯海拉明	1.0 g	(抗组胺成分) 抑制瘙痒的发生
异丙基甲基苯酚	0.1 g	(杀菌成分) 抑制杂菌

辅料：1,3-丁二醇、二氧化硅、二甲聚硅氧烷、羧基乙烯基聚合物、聚氧乙烯硬化蓖麻油、磷酸、磷酸二氢钠、磷酸氢钠、对羟基苯甲酸酯

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请不要换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>