

第2類醫藥品

止癢消炎藥 フェミニーナジェル

販売名：フェミニーナ J

使用注意事項

本劑並非念珠菌症的治療藥。請勿與 Feminina 念珠菌性外陰陰道炎錠等念珠菌症治療藥一起使用

禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 下列人士禁止使用：念珠菌症患者
2. 請勿用於下列部位：眼部周圍、黏膜等

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 有藥物過敏史者
 - (4) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
 - (5) 嬰幼兒
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	起疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

發癢、接觸性皮炎、濕疹、蟲咬、皮膚炎、蕁麻疹、汗疹、潰瘍、凍瘡

用法、用量

- 1 天數次，將本劑適量塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 注意避免跑進眼睛，若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫

(3) 本劑僅限外用

- 相同部位請勿同時使用其他外用劑
- 請勿在患部或其周圍仍是不潔的情況下使用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
利多卡因	2.0 g	(局部麻醉成分) 快速止癢
二苯安明	1.0 g	(抗組織胺成分) 抑制產生搔癢感
異丙基甲基酚	0.1 g	(殺菌成分) 抑制雜菌的發生

添加物：1,3-丁二醇、二氧化矽、聚二甲基矽氧烷、羧乙烯聚合物、聚氧乙烯氫化蓖麻油、磷酸、磷酸二氫鈉、磷酸氫鈉、對羥基苯甲酸

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於乾燥、陰涼處，避免陽光直射
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>