

第1类医药品

阴道外用药 阴道念珠菌病复发治疗药 **フェミニーナ 膣カンジダ錠**

販売名: フェミニーナ 膣カンジダ錠

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用

- (1) 以前未曾被医生诊断为阴道念珠菌病或未接受过相关治疗的人。
- (2) 距上次阴道念珠菌病复发2个月以内的人, 或者即使复发超过2个月, 但最近6个月内发作次数超过2次的人。
- (3) 不清楚是否是阴道念珠菌病复发的人(白带不呈粥状(干酪状)、白色浑浊酒糟状、且有难闻的异味等时, 请考虑是否为其它疾病)
- (4) 有发热、恶寒的人
- (5) 有恶心、呕吐的人
- (6) 下腹部疼痛的人
- (7) 背部或肩部疼痛的人
- (8) 不规则出血或异常出血、白带混有血丝的人
- (9) 阴道内或外阴有溃疡、水肿或疼痛的人
- (10) 有排尿疼痛或排尿困难的人
- (11) 诊断为以下疾病的人: 糖尿病
- (12) 正在使用华法林等抗凝药物的人
- (13) 对本品或本品成分有过敏史的人
- (14) 孕妇或有可能妊娠的人
- (15) 不满15岁的儿童或60岁以上的老年人

2. 在使用本品时, 请勿在外阴部使用如下药物:

除Feminina软膏S等阴道念珠菌病治疗药物以外的皮肤外用药

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 哺乳期的妇女
- (3) 有药物等过敏史的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生或药剂师

相关部位	症状
阴道	疼痛(跳痛)、肿胀感(肿胀感)、发红、刺激感、瘙痒、热感

3. 若使用3天后症状仍无好转, 或使用6天症状仍不消失, 请停止使用, 并接受医生的诊疗

功能、效果

用于阴道念珠菌病的复发

(仅限于曾被医师诊断为阴道念珠菌病、并接受过相关治疗的患者)

用法、用量

成人(15岁以上不满60岁)每日1次,1次1片,塞入阴道深部(最好睡前使用)

请连续使用**6天**。但是若使用**3天后**症状无任何改善,或连续使用**6天后**症状仍未消失,请接受医生的诊疗。

年龄	单次用量	使用次数
成人(15岁以上不满60岁)	1片	每日1次
不满15岁或60岁以上	×不可使用	

<用法与用相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 本品仅限阴道内使用,请勿服用。如果误服,应立即接受医生的诊疗
- (3) 即使使用中途症状消失,也需从使用开始后坚持使用**6天**
- (4) 月经期间请勿使用。如果使用期间来月经,请停止使用。这种情况下应接受医生的诊疗,以确认是否治愈(经期使用有可能无法充分发挥药效)

成分、含量

每日用量(1片)中

有效成分	含量	作用
奥昔康唑硝酸盐	100 mg	杀灭导致阴道念珠菌病的念珠菌

辅料:乳糖水合物、结晶纤维素、羟丙基纤维素、柠檬酸水合物、硬脂酸镁

生活上的注意事项

- (1) 如果阴道念珠菌病复发,伴侣也有可能被感染,应向伴侣告知已感染阴道念珠菌的情况,如果伴侣出现阴部瘙痒、发红等不适症状,请立即接受医生的诊疗
- (2) 为了避免伴侣感染,使用本品时请避免性行为
- (3) 为了避免刺激患部,使用本品时请勿使用杀精剂
- (4) 为了保持药效,请勿自行清洗阴道内部
- (5) 为了避免香皂的刺激,洗澡时请勿用香皂清洗外阴部,建议使用温水轻柔清洗即可
- (6) 念珠菌容易在高温高湿环境中繁殖,因此应尽量保持干燥状态。应注意以下几点
 - 洗澡、游泳后应充分擦干阴道外侧。请尽快换下湿漉的泳衣
 - 如果使用护垫等卫生用品,应勤加更换
 - 内裤应穿透气性好的棉制品
- (7) 每天使用清洁的内裤及毛巾,为了避免感染,毛巾等物请勿与家人共用

(8) 念珠菌也是肠道的常驻菌群。为了避免如厕后来自肠道的感染，便后请从前向后擦拭

(9) 即使瘙痒，也请勿抓挠外阴部。抓挠外阴部有可能加重刺激，或扩大感染

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿使用过期产品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>