

第1類醫藥品

陰道外用藥 念珠菌陰道炎復發治療藥 **フェミニーナ 腔カンジダ錠**

販売名：フェミニーナ 腔カンジダ錠

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士不可使用

- (1) 以前未曾接受過醫師診斷、治療念珠菌陰道炎者
- (2) 2個月以內復發念珠菌陰道炎者、或即使是2個月以上才復發，但最近6個月內感染2次以上者
- (3) 不清楚是否為念珠菌陰道炎復發者 (若白帶不是粥(卡達起司)狀、不是白濁的酒糟狀、有不好的氣味等情況時，有可能是罹患其他疾病)
- (4) 發燒、惡寒者
- (5) 噁心、嘔吐者
- (6) 下腹部出現疼痛者
- (7) 背部或肩膀出現疼痛者
- (8) 不規律的出血或異常出血或分泌物夾雜血絲者
- (9) 陰道或外陰部出現潰瘍、水泡或出現疼痛者
- (10) 排尿疼痛或排尿困難者
- (11) 診斷出有以下症狀者：糖尿病
- (12) 正在使用可邁丁錠 (Warfarin) 等抗凝血藥者
- (13) 對本藥劑或本藥劑的成分曾有過敏反應者
- (14) 孕婦或可能懷孕者
- (15) 未滿15歲的小孩子或60歲以上的高齡者

2. 使用本藥劑期間，外陰部不可使用下述藥品

Feminina軟膏S等治療感染念珠菌藥物除外的皮膚外用藥

諮詢事項

1. 若是下述使用者，使用之前必須諮詢醫師或藥劑師

- (1) 正接受醫師治療者
- (2) 正在哺乳者 靴子
- (3) 對藥物等曾出現過敏反應者

2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師

相關部位	症狀
陰道	疼痛(搏動性抽痛)、腫脹感(腫脹的感覺)、發紅、刺激感、發癢、發熱

3. 使用3天後症狀仍無改善，或使用6天後症狀仍不消失，請停止使用，並接受醫生的診療

功能、效果

治療復發的念珠菌陰道炎（**僅限於之前接受過醫師診斷及治療念珠菌陰道炎者**）

用法、用量

大人（15歲以上未滿60歲）1天使用1次，將1錠插入陰道深處（睡前使用最好）須連續使用**6天**。但是，若已使用**3天**症狀仍無改善、或已使用**6天**症狀仍未消失，則須立即接受醫師的診療。

年齡	1次劑量	使用次數
成人（15歲以上未滿60歲）	1錠	1天1次
未滿15歲或60歲及以上	x 不可使用	

<用法與用量的注意事項>

- （1）請嚴格遵守規定的用法與用量
- （2）本藥僅可用於陰道內，請勿吞服。如果誤食本藥，請立即接受醫生的診療
- （3）即使使用途中症狀消失，也要從使用開始後持續使用 **6天**
- （4）生理期期間不可使用。如果使用適逢生理期，應中止使用。此狀況下應接受醫生的診療，確認是否已經痊癒（生理期期間有可能無法充分發揮藥效）

成分、含量

1日分量（1錠）之中

成分	含量	作用
硝酸奧希康那唑	100mg	消滅導致念珠菌陰道炎的念珠菌

添加物：乳糖水合物、微晶型纖維素、羥丙纖維素、單水檸檬酸、硬脂酸鎂

生活上的注意事項

- （1）**如果念珠菌陰道炎復發，由於可能感染給伴侶，應向伴侶告知已感染念珠菌陰道炎，如果伴侶出現陰部發癢、發紅等不適症狀，請立即接受醫生的診療**
- （2）為了避免伴侶被感染，使用本劑期間請避免發生性行為
- （3）為了避免刺激患部，使用本劑期間不可使用殺精劑
- （4）為了保持藥效，請勿自行清洗陰道內部
- （5）為了避免肥皂刺激外陰部，洗澡時請勿用肥皂清洗，建議使用溫水輕輕清洗
- （6）念珠菌容易在高溫高濕環境中繁殖，因此儘量保持乾燥狀態實屬重要。應注意下列幾點
 - 洗澡、游泳等水中活動後，應充分擦乾陰道外側。濕的泳衣等衣物應儘快換下
 - 如果使用護墊，應勤更換
 - 內褲應穿透氣性好的棉製品
- （7）每天使用清潔的內褲及毛巾，為了避免感染，毛巾等請勿與家人共用
- （8）念珠菌也常存活在腸內。為了避免腸內菌的感染，如廁後請從前向後擦拭
- （9）即使發癢，亦請避免抓外陰部。抓外陰部有可能加重刺激或擴大感染

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿使用過期的產品

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>