

第2类医药品

止痒消炎药 フェミニーナミスト

使用注意事项

本品并非念珠菌病的治疗药。请勿与Feminina 阴道念珠菌片等念珠菌病治疗药一同使用

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 下列人群请勿使用: 念珠菌病患者
2. 下列部位请勿使用: 眼睛周围、粘膜等

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 有药物过敏史的人
 - (4) 患部不干爽、溃烂严重的人
 - (5) 婴幼儿
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

极少数患者可能会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

瘙痒、接触性皮炎、湿疹、虫咬、皮炎、荨麻疹、汗疹、溃烂、冻疮

用法、用量

请每天数次, 取适量本品涂抹(喷涂)于患处

〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
 - (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
 - (3) 本品仅限外用
- 同一部位请勿同时使用其他外用剂
 - 请勿在患部及其周围不清洁的情况下使用
 - 每次喷涂 2~3 次，适量喷于患处

成分、含量		100g 中
盐酸地布卡因	0.3g	(局部麻醉成分) 快速止痒
盐酸苯海拉明	2.0g	(抗组胺成分) 抑制瘙痒的发生
苜索氯铵	0.1g	(杀菌成分) 抑制杂菌
辅料: 甘油、苯扎氯铵、依地酸二钠		

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
 - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 首次使用时，请先空按泵头数次，直至液体喷出

注意事项

念珠菌病、滴虫病等疾病的症状除外阴部瘙痒以外，往往还伴有白带异常。如果白带异常或使用 5~6 天本品后，症状仍无好转，请务必咨询医生

- 残余药量变少时，如果倒立容器喷雾，可能很难喷出药液。此时，保持容器正立后再按下，则容易喷出药液

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>