

第2類醫藥品

止癢消炎藥 フェミニーナミスト

使用注意事項

本劑並非念珠菌症的治療藥。請勿與 Feminina 念珠菌性外陰陰道炎錠等念珠菌症治療藥一起使用

禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 下列人士禁止使用：念珠菌症患者
2. 請勿用於下列部位：眼部周圍、黏膜等

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 有藥物過敏史者
 - (4) 有嚴重濕潤及潰瘍狀況者
 - (5) 嬰幼兒
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

偶有出現下列嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

相關部位	症狀
休克 (過敏性)	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 使用5~6天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

發癢、接觸性皮膚炎、濕疹、蟲咬、皮膚炎、蕁麻疹、汗疹、潰瘍、凍瘡

用法、用量

- 1 天數次，將適量本劑塗抹(噴霧)在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
 - (2) 注意避免跑進眼睛，若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
 - (3) 本劑僅限外用
- 相同部位請勿同時使用其他外用劑
 - 請勿在患部及其周圍骯髒的情況下使用
 - 1 次約噴 2~3 下，噴射時請注意讓藥劑噴到患部上，並適量噴射。

成分、含量

100g 中

鹽酸二丁卡因	0.3g	(局部麻醉成分) 快速止癢
鹽酸苯海拉明	2.0g	(抗組織胺劑) 抑制搔癢感的產生
氯化本索寧	0.1g	(殺菌成分) 抑制雜菌的發生
添加物：甘油、苯扎氯銨、乙二胺四乙基二鈉		

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)
- 第一次使用時請務必空按數次，直至液體噴出為止

注意事項

念珠菌症、滴蟲性陰道炎等疾病，除了外陰部發癢，往往也伴隨白帶異常之情況。如有白帶異常或是使用 5~6 天 Feminamisuto 後，症狀仍無改善，請務必向醫生諮詢

- 殘餘藥量變少時，容器倒立噴霧，可能很難噴出藥液。此時，請保持容器正放並按壓空噴，即可噴出藥液

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>