第 2 类医药品

皮肤・湿疹外用药

フェミニーナ UPa

使用注意事项

禁止事项

（如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应）

下列人群请勿使用：念珠菌病患者

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
   （1）正在接受医生治疗的人
   （2）有药物过敏史的人
   （3）患部不干爽及溃烂严重的人
2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺激感（刺痛感）、热感、干燥感

3. 若使用 1～2 周左右后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

皮炎、瘙痒、湿疹、接触性皮炎、尿不湿接触性皮炎、溃烂、汗疹

用法、用量

1 日数次适量涂于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

（1）幼儿请在监护人的监督指导下使用

（2）请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗

（3）本品仅限外用

（4）请清洁患部后涂抹

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
乌芬那酯	5.0g	抗炎成分
苯海拉明	1.0g	抗组织胺成分
甘草酸	0.3g	抗炎成分
醋酸生育酚酯	0.5g	维生素成分
异丙基甲基苯酚	0.1g	杀菌成分
利多卡因	1.0g	局部麻醉成分

辅料：十六醇、羊毛脂醇、液体石蜡、肉豆蔻酸异丙酯、二甲聚硅氧烷、聚氧乙烯硬化蓖麻油、硬脂酸聚烃氧酯、硬脂酸甘油酯、1.3-丁二醇、甘油、黄原胶、羧乙烯基聚合物、依地酸钠、硬脂酸钾、对羟基苯甲酸酯、pH 调节剂

保管及使用注意事项

(1)请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处

(2)请将本品放在儿童接触不到的地方

(3)请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

(4)请勿靠近火源

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 https://www.kobayashi.co.jp

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。