

第2类医药品

皮肤・湿疹外用薬 フェミニーナ UP

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

下列人群请勿使用: 念珠菌病患者

咨询事项

- 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 有药物过敏史的人
 - 患部不干爽及溃烂严重的人
- 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀、刺激感(刺痛感)、热感、干燥感

- 若使用1~2周左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

皮炎、瘙痒、湿疹、接触性皮炎、尿不湿接触性皮炎、溃烂、汗疹

用法、用量

请每天数次, 取适量涂抹于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
- 本品仅限外用
- 请清洁患部后涂抹

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
乌芬那酯	5.0g	(抗炎成分) 非类固醇类抗炎成分直接作用于患部, 消除发红、炎症
利多卡因	1.0g	(局部麻醉成分) 快速缓解瘙痒和疼痛
马来酸氯苯那敏	1.0g	(抗组织胺作用) 止痒
醋酸生育酚酯	0.5g	(维生素成分) 促进血液循环, 有助皮肤的新陈代谢

辅料: 石蜡油、十六醇、硬脂醇、硬脂酸、凡士林、聚氧乙烯鲸蜡醚、硬脂酸甘油酯、甘油、对羟基苯甲酸酯

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后, 保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中 (可能造成误用或者变质)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>