

第2類醫藥品

外用皮膚濕疹用藥 フェミニーナ UP

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

下列人士禁止使用：念珠菌症患者

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 有藥物過敏史者
 - (3) 皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、刺激感(火辣感覺)、熱感、乾燥感

3. 若使用1~2週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

皮膚炎、發癢、濕疹、長疹子、尿布濕導致的疹子、潰爛、汗疹

用法、用量

1天數次、請取適量塗抹在患部

用法與用量的注意事項

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅限外用
- (4) 請清潔患部後塗抹

成分、含量

100 g 中

成分	含量	作用
烏芬那酯	5.0g	(消炎成分) 非類固醇消炎成分，直接作用於患部，可鎮靜發紅、炎症
利多卡因	1.0g	(局部麻醉成分) 快速止癢、止痛
馬來酸氯苯那敏	1.0g	(抗組織胺作用) 止癢
醋酸鹽維生素 E	0.5g	(維生素成分) 促進血液循環，幫助皮膚新陳代謝

添加物：液態石蠟、1-十六烷醇、硬脂醇、硬脂酸、凡士林、聚氧乙烯鯨蠟醚、硬脂酸甘油酯、甘油、對羥基苯甲酸酯

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>