第 2 類醫藥品

外用皮膚·濕疹用藥

フェミニーナ UPa

使用注意事項

禁止事項

（若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用）

下列人士禁止使用：念珠菌症患者

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
   （1）正在接受醫生治療者
   （2）有藥物過敏史者
   （3）皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、刺激感（火辣感覺）、熱感、乾燥感

3. 若使用 1～2 週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

皮膚炎、發癢、濕疹、長疹子、尿布濕導致的疹子、潰爛、汗疹

用法、用量

1 天數次、請取適量塗抹在患部

用法與用量的注意事項

（1）幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用

（2）請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療

（3）本品僅限外用

（4）請清潔患部後塗抹

成分、含量

100 g 中

成分	含量	作用
烏芬那酯	5.0g	消炎成分
苯海拉明	1.0g	抗組織胺成分
甘草次酸	0.3g	消炎成分
醋酸鹽維他命 E	0.5g	維生素成分
異丙基甲基酚	0.1g	殺菌成分
利多卡因	1.0g	局部麻醉成分

添加物：鯨蠟醇、羊毛脂、液態石蠟、肉豆蔻酸異丙酯、聚二甲基矽氧烷、聚氧乙烯氫化蓖麻油、硬脂酸聚烴氧酯、硬脂酸甘油酯、1.3-丁二醇、甘油、黃原膠、羧乙烯基聚合物、依地酸鈉、硬脂酸鉀、對羥基苯甲酸酯、pH 調節劑

保管與使用相關注意事項

（1）請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處

（2）請存放在幼兒拿不到的地方

（3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

（4）請避免接近火源

銷售商　小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 https://www.kobayashi.co.jp

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。