

## 第2类医药品

中药制剂

ゴホナーズ

## 使用注意事項

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 身体虚弱的人（体力衰弱的人、身体较弱的人）
  - 胃肠虚弱的人
  - 容易出汗的人
  - 老年人
  - 有以下症状的人：浮肿、排尿困难
  - 诊断为患有以下疾病的患者：高血压、心脏病、肾病、甲状腺功能障碍
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化器官	恶心、食欲不振、胃部不适

极少数患者会引发下列严重症状。时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重

- 若服用1个月左右（感冒时5~6天）后，症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

体力中等以上、咳嗽、时有口渴人群的以下各症状：咳嗽、小儿哮喘、支气管哮喘、支气管炎、感冒、痔疮疼痛

## 用法、用量

请按照以下剂量，餐前或餐间用水或温水服用（15岁以下禁止服用）

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	3片	2次
未满15岁	×	不可服用

●餐间是指“两餐之间”，指餐后约2~3小时

## 成分、含量

每日用量（6片）中 含麻杏甘石汤提取物 800mg

<中草药换算量>

麻黄 2.0g、甘草 1.0g、杏仁 2.0g、石膏 5.0g

辅料：二氧化硅、交联羧甲基纤维素钠、滑石、硬脂酸镁、纤维素

●由于本剂采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

## 保管与使用注意事项

- （1）请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童不易接触的地方
- （3）请勿倒入其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>