

## 第2類醫藥品

中藥製劑

## ゴホナーズ

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 身體虛弱者（體力衰退者、身體較弱者）
  - 胃腸虛弱者
  - 容易冒汗者
  - 高齡者
  - 有下列症狀者：浮腫、排尿困難
  - 診斷為下列疾病的患者：高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐、食慾不振、胃部不適

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬之外，還出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

- 若服用約1個月左右（感冒時則5~6天）症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

體力為中等程度以上、咳嗽、有時會感到口渴者的下列病症：咳嗽、小兒氣喘、支氣管氣喘、支氣管炎、感冒、痔瘡疼痛

## 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用（15歲以下禁止服用）

年齡	單次劑量	1天服用次數
成人（15歲以上）	3錠	2次
未滿15歲	× 不可服用	

●餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

## 成分、含量

每天用量（6錠）中 含麻杏甘石湯萃取物 800mg

<原生中藥換算量>

麻黃 2.0g、甘草 1.0g、杏仁 2.0g、石膏 5.0g

添加物：二氧化矽、交聯羧甲基纖維素鈉、滑石、硬脂酸鎂、纖維素

●由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色多少會有差異

## 保管與使用上的注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>