

## 第3类医药品

清肠药

## ガスピタン a

販売名：ガスピタン a

## 使用注意事项

## 咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 有药物过敏史的人
2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

3. 服用后有可能出现下列症状，若该症状持续或加重，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商：腹泻
4. 若服用 2 周左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

清肠（调理通便）、腹部胀满感、软便、便秘

## 用法、用量

请按以下剂量，在饭前或两餐之间咬碎或含在口中溶化服用

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人（15 岁以上）	1 片	3 次
不满 15 岁	× 不可服用	

〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 服用时请务必咬碎或含在口中溶化

●餐间是指“两餐之间”，即餐后大约 2~3 个小时

**成分、含量**

每日用量（3片）中

成分	含量	作用
乳酶生（粪肠球菌）	24 mg	在小肠内增殖，调整肠内菌
乳酶生（嗜酸乳杆菌）	54 mg	在小肠内制造乳酸，抑制有害菌
双歧杆菌	24 mg	在大肠内制造乳酸和醋酸，提高清肠效果
纤维素酶 AP3	180 mg	分解膳食纤维，抑制气体的发生
二甲聚硅氧烷	180 mg	瓦解肠内发生的气体淤积，减轻胀满感

辅料：乳糖醇、纤维素、无水硅酸、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁、CMC - Na、香料

**保管及使用注意事项**

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社  
 大阪市中央区道修町 4-4-10  
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>