

第3類醫藥品

整腸藥 **ガスピタン a**

販売名：ガスピタン a

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 對藥物曾有過敏反應者
- 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

- 服用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 若服用 2 週左右以後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

整腸（調整通便）、腹部脹感、軟便、便秘

用法、用量

在飯前或餐間，咬碎或含在口中溶化，用量如下

年齡	單次劑量	1 天服用次數
成人（15 歲以上）	1 錠	3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - 服用本劑必須咬碎或含在口中溶化
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（3片）中

成分	含量	作用
乳酶生（糞腸球菌）	24 mg	在小腸內增殖，調整腸內菌。
乳酶生(嗜酸乳桿菌)	54 mg	在小腸內製造乳酸，抑制有害菌
雙歧桿菌	24 mg	在大腸內製造乳酸和醋酸，提高整腸效果。
纖維素酶 AP3	180 mg	分解膳食纖維、抑制氣體的發生
聚二甲基矽氧烷	180 mg	瓦解腸內發生的脹氣，減輕膨脹感

添加物：乳糖醇、纖維素、無水矽酸、交錯羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂、CMC-Na、香料。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>