

第2类医药品

中药制剂 ギャクリア

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 曾因药物等引发过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

极少数患者会引发下列严重症状

此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 若服用1个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力中等以下，胃肠弱、食欲不振、胃胀、容易疲劳、因贫血手脚容易发凉的下列诸症：胃炎、胃肠虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、呕吐

用法、用量

请按以下剂量，在餐前或餐间用水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	1包	1天2次
不满15岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间是指“两餐之间”，即餐后大约2~3个小时

成分、含量

每日用量（2包：3.6g）中含六君子汤提取物（1/2量）・・・1.9g

〈从以下中草药中提取〉

人参	・・・・・・・・・・	2.0g
苍术	・・・・・・・・・・	2.0g
茯苓	・・・・・・・・・・	2.0g
半夏	・・・・・・・・・・	2.0g
陈皮	・・・・・・・・・・	1.0g
大枣	・・・・・・・・・・	1.0g
甘草	・・・・・・・・・・	0.5g
生姜	・・・・・・・・・・	0.25g

辅料：硬脂酸镁、硅酸铝、L-薄荷醇、丙二醇、无水硅酸、乳糖

●由于本品使用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>