

第2類醫藥品

中藥製劑 ギャクリア

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 至今曾因藥物等引起起疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

偶有出現以下嚴重症狀的情況。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
肝功能障礙	出現發熱、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食欲不振等症狀。

- 若服用1個月左右，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等以下，胃腸衰弱，沒有食欲，心窩悶，容易疲勞，因貧血手腳容易冰冷的以下諸症：
胃炎、胃腸虛弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法、用量

請在飯前或餐間以水或溫水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	1包	1天2次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

成分、含量

每天用量（2包：3.6g）中六君子湯萃取物（1/2量）・・・1.9g

人蔘	2.0g
蒼朮	2.0g
茯苓	2.0g
半夏	2.0g
陳皮	1.0g
大棗	1.0g
甘草	0.5g
生薑	0.25g

中萃取

添加物：硬脂酸鎂、矽酸鋁、薄荷醇、丙二醇、無水矽酸、乳糖。

●由於本劑使用了天然物（生藥），顆粒的顏色多少會有差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在乾燥涼爽之處，避免陽光直射
- (2) 請存放在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>