

## 第2类医药品

## 便秘药 丸薬七ふく

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 服用本品期间, 请勿服用以下药品  
其他腹泻药(泻药)
2. 哺乳期妇女请勿服用本品, 或者服用本品时要停止哺乳
3. 请勿大量服用本品

## 咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (3) 有药物过敏史的人
  - (4) 有以下症状的人  
剧烈腹痛、恶心和呕吐
2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	剧烈腹痛、恶心和呕吐

3. 服用后可能会出现以下症状, 若该症状持续或者加重, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商  
腹泻
4. 若服用1周左右后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

- 便秘
- 缓解便秘伴发的以下症状:  
头重、潮热、皮肤粗糙、疙瘩、食欲不振(食欲减退)、腹部胀满、肠内异常发酵、痔疮

## 用法、用量

请按照以下剂量，于早晚空腹时以水或温水送服（5岁以下禁止服用）

需注意的是，第一次请服用最小剂量，并根据通便情况及状态，逐渐增减药量

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	15~30粒	2次
11岁以上不满15岁	10~20粒	
7岁以上不满11岁	7~15粒	
5岁以上不满7岁	5~10粒	
不满5岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

(1) 请严格遵守规定的用法与用量

(2) 本品易受潮，因此每次服用后请务必拧紧瓶盖

(3) 幼儿请在监护人的监督指导下服用

- 本品为小药丸，可微调服用量。空腹时、就寝前服用效果较好。通常服用后约8~12小时会有排便通畅的效果
- 空腹时：尽量在餐后2小时以上

## 成分、含量

60粒中

大黄末····· 1000 mg

芦荟末····· 340 mg

牵牛子末····· 200 mg

黄连末····· 100 mg

黄芩末····· 200 mg

川芎末····· 760 mg

山归来末····· 1000 mg

辅料：马铃薯淀粉、寒梅粉

- 本品采用了天然物（中草药），因此药丸的颜色会有少许差异
- 因生产工序上的原因，药丸的大小形状会有少许差异

## 保管及使用注意事项

(1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处

(2) 请将本品放在儿童接触不到的地方

(3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

(4) 请勿用湿手拿取本品

销售商 小林制药株式会社  
大阪市中央区道修町 4-4-10  
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>