

第2类医药品

中药制剂 漢方ヒロレス 十全大補湯錠

(ジュウゼンタイホトウジョウ)

販売名: ヒロレス 十全大補湯錠

使用注意事項

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 胃肠虚弱的人
 - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	胃部不适

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 服用后可能会出现以下症状，若该症状持续或加重，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商：腹泻
- 若服用约1个月后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

有体力虚弱症状的以下各种病症：病后或术后体力下降、疲劳倦怠、食欲不振、盗汗、手脚冰冷、贫血

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服

年 龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15 岁以上)	5 片	1 天 3 次
7 岁以上未满 15 岁	4 片	
5 岁以上未满 7 岁	3 片	
不满 5 岁	×	不可服用

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 幼儿应在监护人的监督指导下服用
- 餐间意味着“两餐之间”，指饭后约 2~3 小时

成分、含量

每天剂量(15 片)中 含十全大补汤提取物(1/2 量) 3.1g

<从以下中草药中提取>

人参	1.5g	黄耆	1.5g	白术	1.5g
茯苓	1.5g	当归	1.5g	芍药	1.5g
地黄	1.5g	川芎	1.5g	桂皮	1.5g
甘草	0.75g				

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、玉米淀粉

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手接触本品

销售商 小林制药株式会社
 大阪市中央区道修町 4-4-10
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>