

## 第2類醫藥品

中藥製劑

## 漢方ヒロレス 当帰芍薬散錠

(トウキシヤクヤクサンジョウ)

販売名：ヒロレス 当帰芍薬散錠

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 胃腸虛弱者
  - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食慾不振、胃部不適

- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

體力虛弱、畏寒症且因有貧血傾向而容易感到疲勞，有時會下腹疼痛、頭重、暈眩、肩頸痠痛、耳鳴、心悸等以下各種症狀：月經不順、月經異常、經痛、更年期障礙、產前產後或流產障礙（貧血、疲勞倦怠、暈眩、浮腫）、暈眩及站起來後頭暈、頭重、肩頸痠痛、腰痛、腰腿發冷、凍瘡、浮腫、斑點、耳鳴

## 用法、用量

請按照下列劑量，於餐間以水或溫水服用。

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	4錠	一天3次
7歲以上未滿15歲	3錠	
5歲以上未滿7歲	2錠	
未滿5歲	× 不可服用	

<用法、用量相關注意事項>

- 請嚴格遵守規定的用法與用量
- 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用

●餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時。

## 成分、含量

每天用量（12片）中 當歸芍藥散萃取物(1/2量) 2.30 g

<原生中藥換算量>

當歸.....	1.5 g	川芎.....	1.5 g
芍藥.....	2.0 g	茯苓.....	2.0 g
蒼朮.....	2.0 g	澤瀉.....	2.0 g

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、乳糖

●本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後，存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>