

第②类医药品

解热镇痛药 **ハッキリエース a**

販売名: ハッキリエース a

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应及事件)

- 下列人群请勿服用
 - 对本品或本品成分有过敏史的人
 - 服用本药或其他解热镇痛药、感冒药后出现过哮喘的人
- 服用本品期间, 请勿服用下列的任何一种药物
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药
- 服用本品前后禁止饮酒
- 请勿长期连续服用

咨询事項

- 下列人群请在服用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生或牙医治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 患有或疑似患有水痘或流感的婴幼儿及儿童(未满 15 岁)
 - 老年人
 - 有药物等过敏史的人
 - 被诊断为患有以下疾病的人: 心脏病、肾病、肝病、胃・十二指肠溃疡
- 服用后如出现下严症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统	眩晕
其他	体温过低

极少数患者可能会引发以下严重症状, 此时请立即接受医生的诊疗

症状名称	症状
休克(过敏性反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
皮肤黏膜眼综合症(史-约综合症) 中毒性表皮坏死松解症 急性泛发性发疹性脓疱病	高烧、眼睛充血、眼屎、口唇溃疡、咽喉疼痛、皮肤大范围出疹与发红, 发红的皮肤上起小疙瘩(小脓疱)、全身乏力、没有食欲等症状持续或突然加重

症状名称	症状
药物超敏反应综合征	出现皮肤大面积发红、全身性皮炎、发热、四肢无力、淋巴结（脖子、腋下、大腿根部等）肿大等症
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸（皮肤及白眼球发黄）、褐色尿、全身乏力、食欲不振等症
肾功能障碍	出现发热、皮疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛（骨节疼痛）、腹泻等症
间质性肺炎	在上楼梯，或进行些许吃力的活动时便会出现气喘、呼吸困难、并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
哮喘	出现呼吸时有哮鸣音，呼吸困难等症

3. 若服用 5~6 次后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

功能、效果

● 头痛、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、挫伤痛、骨折痛、扭伤痛、月经痛（生理痛）、外伤痛的镇痛 ● 恶寒、发热时解热

用法、用量

请按以下剂量，以 1 日 3 次为限，用水或温水送服，尽量避免空腹服用。服用间隔保持 4 小时以上

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15 岁以上）	1 包	最多 3 次
11 岁以上不满 15 岁	2/3 包	
不满 11 岁	× 请勿服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- （1）请严格遵守规定的用法与用量
- （2）儿童请在监护人的监督指导下服用
- （3）未满 11 岁的儿童请勿服用

成分、含量

每日用量（3 包：2352mg）中

有效成分	含量	作用
醋氨酚	690 mg	镇痛、解热作用
乙柳酰胺	690 mg	镇痛、解热作用
咖啡因水合物	225 mg	镇痛辅助作用
芍药提取物(原草药换算量 600mg)	150 mg	镇痛作用
硅酸铝镁	450 mg	胃粘膜保护作用

辅料：甘草提取物粉末、L - 薄荷醇、乳糖、叶绿素铜钠盐、CMC—Ca、羟丙基纤维素

保管和使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 将 1 包分成几次服用时，剩余的药剂应折起袋口保管。另外，保管的剩余药剂请在当天内服用或作废

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>