

## 第②類醫藥品

解熱鎮痛藥 **ハツキリエース a**

販売名：ハツキリエース a

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用及事故)

1. 下列人士不可服用
  - (1) 曾對本劑或本劑成分有過敏反應者
  - (2) 服用本劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥後曾出現過哮喘者
2. 服用本劑期間，請勿服用下列任何醫藥品  
其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮定劑
3. 服用本劑前後請勿喝酒
4. 請勿長期連續服用

## 諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、牙醫、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生或牙醫治療者
  - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - (3) 患有水痘（水皰瘡）或流感或疑似患有以上疾病的嬰幼兒及兒童（未滿 15 歲）
  - (4) 高齡者
  - (5) 有藥物過敏史者
  - (6) 接受過下列診斷者：心臟病、腎病、肝病、胃・十二指腸潰爛
2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、牙醫、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐・嘔吐、食慾不振
精神神經系統	眩暈
其他	體溫過度降低

偶有出現下列嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
皮膚黏膜眼症候群(史蒂芬斯－強森症候群) 毒性表皮壞死溶解症 急性廣泛性發疹性膿疱症	高燒、眼睛充血、眼分泌物、口唇潰爛、喉嚨疼痛、皮膚大範圍長疹子和發紅，發紅的皮膚上起小疙瘩（小膿疱），全身無力、沒有食慾等症狀持續或突然加重

症狀的名稱	症狀
藥物過敏症候群	出現皮膚大範圍發紅，全身性發疹、發燒、身體倦怠、淋巴結（頸部、腋下、大腿根部等）腫脹等症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀
腎臟損害	發燒、長疹子、尿量減少、全身水腫、全身無力、關節疼痛(骨節疼痛)、腹瀉等症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退。
哮喘	呼吸時有異常喘息音。呼吸困難等症狀

3.服用 5~6 次後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、牙醫、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

### 功能、效果

●頭痛、牙痛、拔牙後疼痛、喉嚨痛、耳痛、關節疼痛、神經痛、腰痛、肌肉痛、肩頸痠痛、挫傷痛、骨折痛、扭傷痛、月經痛（生理痛）、外傷痛的鎮痛 ●惡寒、發燒時的解熱

### 用法、用量

1 天 3 次為限，儘量避免空腹服用，服用間隔請保持 4 小時以上，用水或溫水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	最多 3 次
11 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
未滿 11 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用
- (3) 請勿給未滿 11 歲的孩童服用

### 成分、含量

每天用量（3 包：2352mg）中

有效成分	含量	作用
乙醯胺酚	690 mg	鎮痛、解熱作用
鄰乙氧苯甲醯胺	690 mg	鎮痛、解熱作用
咖啡因水合物	225 mg	鎮痛輔助作用
芍藥萃取物(原生藥換算量 600mg)	150 mg	鎮痛作用
矽酸鋁鎂	450 mg	胃黏膜保護作用

添加物：甘草萃取物粉末、L-薄荷醇、乳糖、銅葉綠素鈉、CMC-Ca、羥丙基纖維素

### 保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 將 1 包分成幾次服用時，剩下的藥物請將袋口折好後存放。此外，存放的剩餘藥物請在當日內服用或丟棄

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>