

第2类医药品

内服痔疮用药 **ヘモリンド舌下錠**

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 有药物等过敏史的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、恶心・呕吐、口腔炎症状、腹部胀满感

- 服用后可能会出现以下症状，如果这些症状持续或者加重，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
软便、腹泻
- 若服用1个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

缓解内痔核、外痔核症状

用法、用量

请按以下剂量，于空腹时舌下含服

症状的名称	单次剂量	每日服用次数
急性症	2片	1天4次
一般症状	1片	1天3次
慢性症	第1天 2片	1天4次
	第2天 2片	1天3次
	第3天以后 1~2片*	1天3次

*慢性症患者第3天以后，视情况减量至1次1片

- 未满15岁者请勿服用

症状的名称	症状
急性症	伴有剧烈疼痛、出血、肿胀、瘙痒、違和感等的症状
一般症状	伴有急性症剧痛缓解后的排便痛、出血、肿胀、瘙痒、違和感等的症状
慢性症	伴有长期排便痛、出血、肿胀、瘙痒、違和感等的症状

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 请勿咬碎或吞服（会降低效果）
 - (3) 请将药品含在舌下自然溶化，使其从口腔粘膜吸收
- 空腹时：尽量在餐后 2 小时以上

成分、含量

1 片中

静脉血管丛提取物 . . . 0.18mg

辅料：D-甘露醇、纤维素、白砂糖、酪蛋白胨、羧甲基纤维素、聚乙二醇、滑石、硬脂酸镁、乳糖

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>