

第2類醫藥品

內服痔瘡用藥

ヘモリンド舌下錠

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 有藥物過敏史者
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食慾不振、想吐・嘔吐、口腔炎般的症狀、腹部脹

- 服用後有時會出現下列症狀，如果這些症狀一直持續或者加重，請停止服用，向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
軟便、腹瀉
- 服用1個月左右後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

緩和內痔核、外痔核症狀

用法、用量

空腹時放在舌下間服用，用量如下

症狀的名稱	單次劑量	每天服用次數
急性症狀	2顆	1天4次
一般症狀	1顆	1天3次
慢性症狀	第1天 2顆	1天4次
	第2天 2顆	1天3次
	第3天以後 1~2顆*	1天3次

*慢性症患者第3天以後，視情況減量至1次1顆

- 未滿15歲請勿服用

症狀的名稱	症狀
急性症狀	伴隨劇烈疼痛、出血、腫脹、發癢、違和感等症狀
一般症狀	急性症狀劇痛緩和後的排便疼痛、出血、腫脹、發癢、違和感等症狀
慢性症狀	伴隨長期排便疼痛、出血、腫脹、發癢、違和感等症狀

<用法與用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 請勿咬碎或吞下（會降低效果）
 - (3) 含在舌下，讓藥片自然溶化，從口腔黏膜吸收。
- 空腹時：盡量於餐後 2 小時以上

成分、含量

1 顆中

靜脈血管叢萃取物 . . . 0.18mg

添加物：D-甘露醇、纖維素、白糖、酪蛋白製消化蛋白質、羧甲基纖維素、聚乙二醇、滑石、硬脂酸鎂、乳糖

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>