

第3類醫藥品

口腔咽喉藥 ハレナーススプレー

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，當前的症狀會惡化，或者易引發副作用。)
請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生或牙科醫生診療者
- (2) 曾對藥物過敏反應者
- (3) 有以下症狀者：口腔嚴重潰爛

2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	胃部不適、噁心

3. 使用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止使用，並持本說明書向醫生、牙科、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：

口部刺激感

4. 若使用5~6天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

因喉嚨發炎引起的喉嚨痛、喉嚨腫脹、喉嚨乾裂、喉嚨不適、聲音沙啞，口腔潰瘍

用法、用量

請以適當的量每天噴塗患部數次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 喉嚨發炎時，請將噴嘴對準喉嚨患部，一邊輕輕吐氣一邊噴塗（若在吸氣的同時使用，可能導致液體進入支氣管和肺部）
- (2) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用。
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (4) 僅用於噴塗
- (5) 不慎飲入大量藥液時，請立即接受醫生的診療

成分、含量

100mL 中

呱侖酸鈉水合物 · · · · · 0.02 g

氯化十六烷基吡啶水合物 · · 0.3 g

添加物：D-山梨糖醇、丙二醇、甘油、磷酸二氫鈉、磷酸氫鈉、乙醇、l-薄荷醇

保管與使用相關注意事項

- (1) 請在蓋緊瓶蓋後直立存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
 - (4) 請避免接近火源
 - (5) 在使用本劑後於一定時間內，因可能會被檢測出吐氣所含酒精濃度超過酒駕值，故請避免於駕駛中使用
- 使用後，請務必將噴嘴返回原始位置，並蓋好瓶蓋進行保管。
 - 攜帶出門時，請將其裝入附帶的塑膠袋中
 - 若使用藥物過程中導致衣物染色時，請立即用水清洗
 - 液體無法噴出時，請反覆按下噴頭，直到液體噴出為止。另外，請勿使用針類物品穿刺噴嘴尖端

嚴禁火源

第二石油類 危險等級 III

丙二醇含有物 水溶性

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>