

第3類醫藥品

口腔、咽喉用藥 **ハレナーズ**

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

1. 服用本藥物期間，請勿服用下列的任何一種藥物
 - (1) 含有甘草或其主成分為甘草甜素的口服藥
(可能會發生水腫、血壓升高以及肌肉疾病(肌病)等)
 - (2) 含有傳明酸的口服藥
(鼻炎口服藥、感冒藥、解熱鎮痛藥，止咳去痰藥等)
2. 請勿長期連續使用

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生或牙科醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 年長者
 - (4) 對藥物有過敏反應者
 - (5) 有下列症狀者：水腫
 - (6) 被診斷為下列疾病者
有高血壓、心臟病、腎臟病、血栓者(腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎等)、可能發生血栓症者
2. 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、胃灼熱、食欲不振或食欲增加、胃部不適、胃脹
精神神經系統	暈眩
其他	頻尿

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀
若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬之外，還出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

3. 服用後可能會出現下列症狀，若此類症狀持續或惡化，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
腹瀉
4. 如服用5~6天後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

扁桃腺炎（喉嚨腫脹、喉嚨痛）、咽喉炎、口腔炎

用法、用量

請在早、中、晚服用下述用量

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	3 次
7 歲以上未滿 15 歲	1/2 包	
未滿 7 歲	× 請勿服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用

●不用水也可以服用

成分、含量

每天用量(3 包：3.9g)中

傳明酸.....	750mg
甘草萃取物.....	198mg（原始藥草換算量 990mg）
吡哆醇鹽酸鹽（維生素 B ₆ ）.....	50mg
核黃素（維生素 B ₂ ）.....	12mg
抗壞血酸鈉（維生素 C 鈉）.....	500mg

添加物：赤蘚醇、預膠化澱粉、二氧化矽、滑石、焦糖、無水矽酸、1-薄荷醇、香料

<成分與含量的注意事項>

- (1) 由於本藥物中有添加核黃素（維生素 B₂），尿液可能會變成黃色
- (2) 服用本藥物會對尿液以及糞便的檢查值產生影響

接受醫生檢查時，請告知醫生正在服用含有維生素 C 的製劑

●由於本劑使用了天然物（草藥），顆粒的顏色多少會有差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 將 1 包分成幾次服用時，剩下的藥物請將帶口折好後存放
另外，存放的剩餘藥物請在當日內服用或丟棄

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>