

第 2 类医药品

干燥性皮肤用药 皮脂枯れ肌改善薬 ヒシモア

販売名：ヒシモア

使用注意事项

禁止事项

- (如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)
1. 下列人群请勿使用
- (1) 患出血性血液病（血友病、血小板减少症、紫斑病等）的人
 - (2) 即使出血量极少也可能会引发严重后果的人（本药具有抑制血液凝固的作用，有可能导致出血加重）
 - (3) 患有特应性皮炎的人（即使症状较轻，也需要在医生的指导下接受适当的治疗）

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
- (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
 - (3) 患部不干爽和溃烂严重的人
 - (4) 被医生诊断为特应性皮炎的人
2. 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

3. 若使用 5～6 天后症状仍无好转，请停止使用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

干皮病、肘部、膝盖、脚跟、脚踝部的角化症、手脚的开裂与龟裂、儿童的干性皮肤、手指粗糙、冻伤（溃烂除外）、伤口及烫伤后的皮肤硬结、紧绷（面部除外）、跌打损伤及扭伤后的肿胀、肌肉痛、关节痛

用法、用量

每天 1～数次，取适量本品涂抹于患部，或涂抹在纱布等上贴于患部

＜用法与用量相关的注意事项＞

- （1）每次使用后，请务必拧紧瓶盖
- （2）儿童请在监护人的监督指导下使用
- （3）请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- （4）本品仅限外用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
类肝素	0.3g	滋润角质，提高柔软性，改善皮肤的屏障功能
苯海拉明	0.5g	通过抗组胺作用抑制瘙痒的发生
γ 谷维素	1.0g	提高皮脂腺活性，促进皮脂分泌

辅料：凡士林、角鲨烷、石蜡油、肉豆蔻酸异丙酯、二甲聚硅氧烷、1,3-丁二醇、丙二醇、2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱-甲基丙烯酸丁酯共聚物、N-（十六烷氧基羟丙基）-N-羟乙基十六酰胺、鲸蜡醇、硬脂醇、聚山梨酯 60、自乳化型硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯硬化蓖麻油、羧乙烯基聚合物、依地酸二钠、对羟基苯甲酸酯、三乙醇胺、pH 调节剂

保管及使用注意事项

- （1）请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 请注意：如果沾染在衣物上，少数情况下可能会使衣物发黄。

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>