

第 2 类医药品

女性保健薬 命の母 A

販売名：女性保健薬 命の母 A

使用注意事項

禁止事項

（如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应）
哺乳中的妇女不能服用本品，需服用本品时请停止哺乳

咨询事項

- 1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - （1）正在接受医生治疗的人
 - （2）孕妇或有可能妊娠的妇女
 - （3）有药物等过敏史的人
 - （4）身体虚弱的人（体力衰弱、身体较弱的人）
 - （5）胃肠虚弱、易腹泻的人
- 2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	胃部不适、食欲不振、恶心、呕吐、伴有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

- 3. 服用后有可能出现下列症状，若这些症状不见好转或持续恶化，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
便秘、腹泻
- 4. 若服用一段时间后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 5. 服用后可能会导致生理期提前，经血量略微增多
长时间持续出血时，请持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

更年期障碍、更年期神经官能症、血道症^{注)}、潮热、月经不调、月经异常、月经痛、颈强直、寒症、皮肤粗糙、头晕、耳鸣、心悸、贫血、痤疮、便秘、瘰病、白带、产前产后、腹部和腰部疼痛、血压异常、头痛、头重

注）“血道症”是指伴随月经、妊娠、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙变动所出现的精神不安和焦躁等神经精神症状以及身体症状

用法、用量

每次 4 片、每天 3 次，请于饭后用水或温水送服

〈用法与用量的注意事项〉

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 本品容易受潮，每次服用后请务必盖好瓶盖

●15 岁以下禁止服用

成分、含量

每天剂量（12 片）中含

大黄末·····175mg	红花····· 50mg
缬草末·····207mg	盐酸氯化硫胺素（维生素 B ₁ ）····· 5mg
桂皮粉 ·····170mg	核黄素（维生素 B ₂ ）····· 1mg
川芎末·····100mg	盐酸吡哆醇（维生素 B ₆ ）·····0.5mg
苍术末·····100mg	氰钴胺素（维生素 B ₁₂ ）····· 1 μg
芍药末·····300mg	泛酸钙····· 5mg
茯苓末·····175mg	叶酸·····0.5mg
当归末·····300mg	牛磺酸····· 90mg
香附子末····· 50mg	d1-α-生育酚琥珀酸酯（维生素 E）·· 5mg
吴茱萸····· 40mg	磷酸氢钙水合物····· 10mg
半夏····· 75mg	生物素····· 1 μg
胡萝卜末····· 40mg	精制大豆卵磷脂····· 10mg

辅料：硅酸铝、硬脂酸镁、紫胶、滑石、碳酸钙、氧化钛、马铃薯淀粉、明胶、白糖、赤藓红、胭脂红、日落黄、蜂蜡、巴西棕榈蜡

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请不要用湿手接触本品
- (5) 请勿服用干燥剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>

中国語（简体中文） 2018.12 作成

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。