

第2類醫藥品

女性保健藥 命の母 A

販売名：女性保健藥 命の母A

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

哺乳中的婦女請勿服用本劑，需服用本劑時請避免哺乳

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 對藥物有過敏反應者
 - 身體虛弱者(體力衰退、身體虛弱者)
 - 胃腸虛弱、易腹瀉者
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	胃部不適、食欲不振、噁心、嘔吐、伴有劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

- 服用後有可能出現下列症狀，若此類症狀持續或惡化，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
便秘、腹瀉
- 若服用一段時間後症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 服用後可能會導致生理期提前、經血量略微增多
長時間持續出血時，請持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

更年期障礙、更年期精神官能症、血道症^{注)}、潮熱、生理不調、生理異常、生理痛、肩頸痠痛、手腳冰冷、皮膚粗糙、暈眩、耳鳴、心悸、貧血、痤瘡、便秘、歇斯底里、白帶、產前產後、腹部和腰部疼痛、血壓異常、頭痛、感覺頭重不舒適

注)所謂「血道症」，是指伴隨月經、妊娠、分娩、產後、更年期等因女性荷爾蒙變動而產生的精神不安和焦躁等精神神經症狀以及身體症狀

用法、用量

每次 4 顆、每天 3 次，請於餐後以水或溫水服用

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 由於易受潮，因此在每次服用後都請蓋緊瓶蓋

●15 歲以下禁止服用

成分、含量

每天劑量（12 顆）中含

大黃粉末·····175mg	紅花·····50mg
纈草粉末·····207mg	鹽酸硫胺（維生素 B ₁ ）·····5mg
桂皮粉 ·····170mg	核黃素（維生素 B ₂ ）·····1mg
川芎粉末·····100mg	吡哆醇鹽酸鹽（維生素 B ₆ ）·····0.5mg
蒼朮粉末·····100mg	氰鈷胺（維生素 B ₁₂ ）·····1 μg
芍藥粉末·····300mg	泛酸鈣·····5mg
茯苓粉末·····175mg	葉酸·····0.5mg
當歸粉末·····300mg	牛磺酸·····90mg
香附子粉末·····50mg	dl-α-生育酚琥珀酸酯（維生素 E）·····5mg
吳茱萸·····40mg	磷酸氫鈣水合物·····10mg
半夏·····75mg	生物素·····1 μg
人參粉末·····40mg	精製大豆卵磷脂·····10mg

添加物：矽酸鋁、硬脂酸鎂、蟲膠、滑石、碳酸鈣、氧化鈦、馬鈴薯澱粉、明膠、白糖、紅黴素、新胭脂紅、日落黃、蜂蠟、棕櫚蠟

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中。（可能造成誤用或者變質）
- (4) 在手沾濕的狀況下請不要觸碰本劑
- (5) 請勿服用乾燥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>

中国語（繁体中文）

2018.12 作成