

第 2 类医药品

中药制剂 命の母ホワイトシリーズ チラック

販売名：チラック

使用注意事項

咨询事项

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
- (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 胃肠虚弱易腹泻的人
 - (4) 高龄者
 - (5) 有以下症状的人：浮肿
 - (6) 被诊断为以下疾病的人：高血压、心脏病、肾病
2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适、腹痛

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、肌病	出现手脚乏力、发麻、肌肉紧张及僵硬感、全身无力、肌肉痛症状，并逐渐加重

3. 服用后可能会出现以下症状，若该症状持续或加重，应停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询：腹泻
4. 服用 1 个月左右（痔疮出血时服用 1 周左右）症状仍未好转时，应停止服用，并拿着该药袋向医师、药剂师或注册销售员咨询
5. 长期连续服用时，请向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

中度体力以下、虚寒体质、有出血倾向、无胃肠障碍者，出现以下症状：
月经异常/经血量过多/异常出血、痔疮出血、贫血、皮下出血

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服

年 龄	单次剂量	每天服用次数
成人（15 岁以上）	5 片	1 天 3 次
不满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

●餐间意味着“两餐之间”，指饭后约 2～3 小时

成分、含量

每天剂量（15 片）中 芎归胶艾汤精华 3.8g

<从以下中草药中提取>

川芎	1.5g	甘草	1.5g
艾叶	1.5g	明胶	1.5g
当归	2.25g	芍药	2.25g
地黄	3.0g		

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、乳糖

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- （1）请将盖子盖紧，存放在避免阳光直射，低湿度的阴凉处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- （4）请勿用湿手接触本品

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>