

第2類醫藥品

中藥製劑

命の母ホワイトシリーズ チラック

販売名：チラック

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 胃腸虛弱易腹瀉者
 - 高齡者
 - 有下列症狀者：水腫
 - 接受過以下診斷的人：高血壓、心臟病、腎病
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	食欲不振、胃部不適、腹痛

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	強出現手腳無力、發麻、緊繃感及僵硬，進而出現全身無力、肌肉痛症狀，並逐漸加重

- 服用後有時會出現下列症狀，如果這些症狀一直持續或加重，請停止服用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員：腹瀉
- 若服用此藥約一個月（用於治療痔瘡出血時約一週）後症狀仍未改善，請停止服用，並持此藥袋諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售員
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力中等程度以下、虛寒體質、有出血傾向、無腸胃疾病者，出現以下症狀：

月經不規則/經血量過多/不正常出血、痔瘡出血、貧血、皮下出血

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	5 錠	一天 3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

●餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

成分、含量

每天用量（15 錠）中 芎歸膠艾湯精華 3.8g

<原生中藥換算量>

川芎	1.5g	甘草	1.5g
艾葉	1.5g	明膠	1.5g
當歸	2.25g	芍藥	2.25g
地黃	3.0g		

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、乳糖

●本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊蓋子，保存於不會直曬陽光，濕度低的陰涼處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>