

女性薬 命の母ホワイト

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)
哺乳中的妇女不能服用本品, 需服用本品时请停止哺乳

咨询事項

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 有药物等过敏史的人
 - 身体虚弱的人(体力衰弱、身体较弱的人)
 - 胃肠虚弱、易腹泻的人
- 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	胃部不适、食欲不振、恶心、便秘、伴有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

- 服用后有可能出现下列症状, 若这些症状不见好转或持续恶化, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
腹泻
- 若服用一段时间后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

痛经、月经不调、瘕病、腰痛、头痛、贫血、寒症、血道症^{注1)}、颈强直、眩晕、心悸、带下^{注2)}

注1) “血道症”是指伴随月经、妊娠、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙变动所出现的精神不安和焦躁等神经精神症状以及身体症状

注2) “带下”即白带

用法、用量

每次4片、每天3次，请于饭后用水或温水送服

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 本品容易受潮，每次服用后请务必盖好瓶盖
 - 15岁以下禁止服用

成分、含量

每天剂量（12片）中

当归末	••••	300 mg	川芎末	•••	200 mg	芍药末	•••	300 mg
茯苓末	••••	200 mg	苍术末	•••	200 mg	泽泻末	•••	150 mg
桂皮末	••••	200 mg	牡丹皮末	••	200 mg	大黄末	•••	200 mg
桃仁末	••••	100 mg	人参末	•••	50 mg			

辅料：硅酸铝、滑石、碳酸钙、氧化钛、明胶、阿拉伯树胶、白砂糖、蜂蜡、巴西棕榈蜡

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请不要用湿手接触本品
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃
- (6) 请勿服用干燥剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>