

## 第2類醫藥品

## 女性薬 命の母ホワイト

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)  
 哺乳中的婦女請勿服用本劑，需服用本劑時請避免哺乳

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 對藥物有過敏反應者
  - 身體虛弱者（體力衰退、身體虛弱者）
  - 胃腸虛弱、易腹瀉者
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子與發紅、發癢
消化器官	胃部不適、食欲不振、噁心、便秘、伴有劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

- 服用後有可能出現下列症狀，若此類症狀持續或惡化，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢  
 腹瀉
- 若服用一段時間後症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

月經痛、月經不調、歇斯底里、腰痛、頭痛、貧血、手腳冰冷、血道症<sup>注1)</sup>、肩頸酸痛、眩暈、心悸、帶下<sup>注2)</sup>

注1) 所謂「血道症」，是指伴隨月經、妊娠、分娩、產後、更年期等因女性荷爾蒙變動而產生的精神不安和焦躁等精神神經症狀以及身體症狀

注2) 所謂「帶下」就是白帶

## 用法、用量

每次 4 顆、每天 3 次，請於餐後以水或溫水服用

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 由於易受潮，因此在每次服用後都請蓋緊瓶蓋
- 15 歲以下禁止服用

## 成分、含量

每天劑量（12 顆）中含

當歸粉末	300 mg	川芎粉末	200 mg	芍藥粉末	300 mg
茯苓粉末	200 mg	蒼朮粉末	200 mg	澤瀉粉末	150 mg
桂皮粉末	200 mg	牡丹皮粉末	200 mg	大黃粉末	200 mg
桃仁粉末	100 mg	人參粉末	50 mg		

添加物：矽酸鋁、滑石、碳酸鈣、氧化鈦、明膠、阿拉伯膠、白糖、蜂蠟、巴西棕櫚蠟

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中。（可能造成誤用或者變質）
- (4) 在手沾濕的狀況下請不要觸碰本劑
- (5) 瓶中的充填物是用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉
- (6) 請勿服用乾燥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>