

第2類醫藥品

鎮定劑 **イララック**

販売名：イララック a

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 服用本劑期間請勿服用以下藥品：其他鎮定劑
2. 請勿長期連續服用

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 哺乳中的婦女
 - (4) 曾因藥物出現過敏症狀或哮喘者
2. 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐・嘔吐、食欲不振

3. 如服用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

鎮定焦躁感、興奮感、緊張感，
緩和因上述症狀導致的疲勞倦怠感、頭重

用法、用量

用水或溫水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	2 顆膠囊	1 天 2 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

成分、含量

每天用量（4 顆膠囊）中

成分	含量	作用
西番蓮萃取物	0.1g (相當於西番蓮 0.7g)	粉色西番蓮(西番蓮科)全草提取的萃取物，具有鎮定作用。
鹿子草萃取物	0.24g (相當於鹿子草 1.2g)	從鹿子草(敗醬科)的根提取的萃取物，具有鎮定作用。
蛇麻萃取物	60mg (相當於蛇麻 0.852g)	從蛇麻(大麻科)的果穗提取的萃取物，具有鎮定作用。
釣藤鉤萃取物	45mg (相當於釣藤鉤 0.45g)	從嘴葉鉤藤(茜草科)的莖枝提取的萃取物，具有鎮定作用。

添加物：羥丙基纖維素、CMC-Ca、乳酸鈣、無水矽酸、馬鈴薯澱粉、明膠、月桂醇硫酸鈉、黃色 4 號（檸檬黃）、藍色 1 號

●由於本劑使用了天然藥物（生藥），膠囊的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥、涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>