

## 肠胃药 イラクナ

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

## 1. 下列人群请勿服用

(1) 对本品或本品成分有过敏史的人

(2) 出现以下症状的患者

不明原因的体重减轻、反复呕吐、血便(焦油状黑便)、发烧

(3) 孕妇或有可能妊娠的妇女

(4) 未满15岁的儿童

## 2. 本品服用期间, 请勿服用下列药品

胃肠动力改善药(枸橼酸莫沙必利水合物、盐酸阿考替胺水合物等)、肠胃镇痛镇痉药、含有莨菪浸膏的肠胃药、含有氯贝胆碱的肠胃药、晕车药、鼻炎用口服药、感冒药(可能会增加或减少本药的胆碱作用)

## 3. 哺乳期的患者不可服用本药

(在动物实验中出现过本药向乳汁中转移的情况)

4. 请勿长期连续服用

## 咨询事项

## 1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师

(1) 正在接受医生治疗的人

(2) 老年人

(3) 有药物过敏史的人

(4) 诊断患有以下疾病的人: 肾病、肝病

(5) 曾患过以下疾病的人: 胃癌、胃十二指肠溃疡

## 2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生或药剂师

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	腹泻、便秘、腹痛、恶心、唾液增加
精神神经系统	颤抖、头痛、易怒、睡眠障碍、眩晕
循环系统	心悸

其他	胸部和背部疼痛、疲劳感、分泌乳汁、闭经、男性乳房肥大（男性出现类似女性的乳房）
----	---

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 (过敏性反应)	服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸（皮肤及白眼球发黄）、褐色尿、全身乏力、食欲不振等症状

3. 服用2周后，症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生或药剂师

### 功能、效果

胃胀、胃部及腹部胀满感、食欲不振、烧心、恶心、呕吐

### 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	1片	1天3次
不满15岁	× 不可服用	

<用法与用量的相关注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 直接服用药片，不要掰开

### 成分、含量

每日用量（3片）中

成分	含量	作用
盐酸伊托必利	150 mg	激活减少的胃肠蠕动

辅料：乳糖、玉米淀粉、CMC、无水硅酸、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、氧化钛、巴西棕榈蜡

### 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 不可服用过期的产品

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>