

第1類醫藥品

胃腸藥 イラクナ

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能會使目前的症狀惡化，或容易產生副作用)

1. 下列人士不可服用

- (1) 對本劑或本劑成分有過敏反應者
- (2) 具有下列症狀者

原因不明的體重下降、反覆嘔吐、血便(黑色柏油狀糞便)、發燒

- (3) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- (4) 未滿 15 歲的兒童

2. 服用本劑期間請勿服用以下藥品

腸胃蠕動功能改善藥(枸橼酸莫沙必利水合物、阿考替胺鹽酸鹽水合物等)、胃腸鎮痛鎮痙藥、含東莨菪浸膏之胃腸藥、含氯化脲酯膽鹼之胃腸藥、暈車藥、鼻炎用內服藥、感冒藥(恐增強或減弱本劑膽鹼作用)

3. 哺乳期婦女請勿服用本劑

(經動物實驗證實將會轉移至乳汁中)

4. 請勿長期連續服用

諮詢事項

1. 下列人士在服用前，請向醫生或藥劑師

- (1) 正在接受醫師治療者
- (2) 高齡者
- (3) 有藥物過敏史者
- (4) 接受過以下診斷的人：腎病、肝病
- (5) 曾患過以下疾病的人：胃癌、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	腹瀉、便秘、腹痛、想吐、唾液增加
精神神經系統	顫抖、頭痛、焦躁感、睡眠障礙、眩暈
循環系統	心悸
其他	胸背疼痛、疲勞感、分泌乳汁、無月經、女乳症(男性長出如女性般乳房的症狀)

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，請立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	服用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

3. 若服用2週後，症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師

功能、效果

胃下垂、胃部・腹部膨脹感、食慾不振、心口灼痛、想吐、嘔吐

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	1錠	1天3次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 錠劑不需剝半，直接服用即可

成分、含量

每天用量（3錠）中

成分	含量	作用
鹽酸伊托必利	150 mg	活化衰弱的胃部蠕動

添加物：乳糖、玉米澱粉、CMC、無水矽酸、硬脂酸鎂、羥丙甲纖維素、聚乙二醇、氧化鈦、巴西棕櫚蠟

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請保管在孩童拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿服用過期產品

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>