

## 第2类医药品

用于治疗皮肤硬结、鸡眼和疣的药剂

## カクナクト

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 请勿用于下列部位

- (1) 眼睛周围、粘膜、柔软的皮肤表面(脖子附近等)、面部等
- (2) 有炎症或者伤痕的患处(可能导致症状恶化)
- (3) 传染性软疣
- (4) 老年人易患的黑褐色扁平疣
- (5) 在外阴部和肛门周围形成的疣
- (6) 成簇生长的疣、多发于身体的疣
- (7) 沿着抓痕排成一列的疣

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 婴幼儿(皮肤较弱, 需要注意)
- (2) 有药物等过敏史的人
- (3) 妊娠或有妊娠可能的妇女(口服水杨酸动物实验报告称, 本品有导致胎儿畸形的作用)
- (4) 正在接受糖尿病治疗的人

2. 使用本剂治疗疣时, 本剂只对已角质化的表面粗糙的硬疣有效。

治疗其他的疣时, 应向医生、药剂师或者注册销售人员咨询

3. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

4. 若使用约1个月后症状仍无改善, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

皮肤硬结、鸡眼、疣

## 用法、用量

紧密贴于患处，每 3~4 天换一次

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (2) 药剂部分附着在健康皮肤上时，该部分会变白变软、出现损伤，所以使用时应注意不要沾在患处周围的皮肤上
- (3) 揭除时应缓慢操作，避免损伤皮肤
- (4) 本品仅限外用
  - 请阅读背面的<正确的使用方法>

## 成分、含量

每 100mg 膏体中含水杨酸 50.0mg (50%)

成分	药剂部分的直径	作用
水杨酸	8mm (一般尺寸)	软化角质
	13mm (大尺寸)	

辅料：白蜂蜡、聚丁烯、聚氧乙烯十六烷基醚和另外 1 种成分

## 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中 (可能造成误用或者变质)

### <形状>

**药剂部分：**有效成分水杨酸可软化角质，从而去除变硬的角质。



**保护垫：**带有胶粘剂，不易移位，可保护患处，缓解压迫导致的疼痛。

### <使用前>

- ① 请确认您所选择的尺寸是否与患处 (角质变硬变厚的部分) 的大小相符。
  - 患处在 12~18mm 时：一般尺寸
  - 患处在 18~30mm 时：大尺寸

※ 药剂附着在健康皮肤上时，该部分会变白变软、出现损伤，不知如何选择时，请选择小于患处面积的尺寸。

不适用于患处在11mm以下的症状。

- ② 使患处处于清洁、干燥的状态。（通过洗澡等使患处变软并仔细擦干后再使用时，效果更佳。）

#### <正确的使用方法>

- ① 请撕下剥离纸A，将药剂的中央部分对准患处最硬的部位贴上，待固定后撕下剥离纸B，并使胶布充分贴合。

（粘贴方法示例）

贴于足底时



贴于手指时



- ② 请持续贴3~4天。有效成分水杨酸从药剂部分渗透过来，患处逐渐变白。  
 ※ 在洗澡等时也不要将本剂取下来。  
 如果淋湿了，请用干毛巾等擦干水分。  
 胶布移位或者脱落时，请予以更换。
- ③ 更换时，请用镊子等以不会感觉疼痛的力度去除发白、泡涨的角质。
- ④ 请按照①~③的步骤反复使用，直至患处完全好转。  
 ※ 特别是疣的中心部分，完全去除需要很长时间。
- ⑤ 去除变厚的角质后，会出现患处凹陷、角质变白的情况，但会重新长出新的皮肤，因此请先清洁好该部位。  
 此外，如果患处会疼痛，请贴创可贴等进行保护。

销售商 小林制药株式会社  
 大阪市中央区道修町 4-4-10  
 主页 <https://www.kobayashi.co.jp>