

## 第2類醫藥品

繭、雞眼、疣用藥 **カクナクト**

## 使用注意事項

## 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1.請勿用於以下部位

- (1) 眼睛周圍、黏膜、柔軟的皮膚表面（脖子附近等）、臉部等
- (2) 發炎或受傷患處（可能會使症狀惡化）
- (3) 水疣
- (4) 年長者易得的黑褐色扁平疣
- (5) 長在外陰部或肛門周圍的疣
- (6) 群聚生長的疣、多發於身體的疣
- (7) 沿著抓傷而產生整排的疣

## 諮詢事項

1.下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 嬰幼兒（皮膚較為敏感，需多加注意）
- (2) 曾對藥物等產生過敏反應者
- (3) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女（在服用水楊酸的動物實驗報告中指出，會有引發胎兒畸形的副作用）
- (4) 正在接受糖尿病治療者

2.如欲使用本產品治療疣，本產品只對角質化且表面粗糙的硬疣有效。

關於其它種類的疣，請諮詢醫師、藥劑師或藥品經銷商

3.使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	起疹子和發紅、發癢、腫脹

4.如使用約1個月後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

繭、雞眼、疣

## 用法、用量

請以輕壓的方式貼於患處，並每隔 3~4 天更換一次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
  - (2) 藥劑部分若貼附於健康皮膚，該處將會軟化變白，且造成皮膚受損，因此使用時請小心不要貼到患處周圍的皮膚
  - (3) 撕下時請慢慢撕除，避免傷到皮膚
  - (4) 本品僅供外用
- 請參閱背面的<最佳使用方式>

## 成分、含量

膏體 100mg 內含水楊酸 50.0mg (50%)

成分	藥劑部分的直徑	作用
水楊酸	8mm (普通尺寸)	軟化角質
	13mm (加大尺寸)	

添加物：白蜂蠟、聚丁烯、聚氧乙烯鯨蠟醚及其它 1 項成分

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)

### <形狀>

藥劑部分：有效成分水楊酸能軟化角質，去除硬化的角質。



保護墊：有黏著劑，不易移位，可保護患處並舒緩因壓迫而產生的疼痛感。

### <使用前>

- ① 請確認選購尺寸是否符合患處 (角質硬化變厚的部分) 的大約大小。
  - 患處為 12 ~ 18mm 時：普通尺寸
  - 患處為 18 ~ 30mm 時：加大尺寸

※藥劑若貼附於健康皮膚，該處會軟化變白，造成皮膚受損，如有疑慮請選購比患處小的尺寸。

不適用於患處11mm以下的症狀。

- ② 保持患處清潔乾爽。（透過洗澡等方式軟化患處，並擦乾水分後再使用會更有效。）

#### <最佳使用方式>

- ① 撕除離型紙A，將藥劑中央部分貼在患處最硬的部位，固定後撕除離型紙B，讓貼布緊密貼合。

（貼法範例）



- ② 請連續貼3~4天。有效成分水楊酸會從藥劑部分滲透進皮膚內，患處會漸漸變白。  
 ※洗澡時等也請貼著，請勿撕除。  
 濕掉時請以乾毛巾等拭去水分。  
 貼布移位或脫落時請進行更換。
- ③ 更換時請使用鑷子等工具，以不弄痛患處為前提去除軟化變白的角質。
- ④ 請重複①~③的步驟，直到患處完全脫落為止。  
 ※特別是芯的部分需花費較長時間才會完全脫落。
- ⑤ 去除變厚的角質後，患處會凹陷，角質也會變白，但會再長出新的皮膚，故請事先保持患處清潔。  
 此外，若患處會感到疼痛，請貼上OK繃等。

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>

中国語（繁体中文） 2020.03 作成

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。