

第2類醫藥品

殺菌消毒藥 **キズアワワ**

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
對本劑或本劑成分曾有過敏反應者
2. 請勿用於以下部位
眼部周圍、黏膜等部位

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 對藥物曾有過敏反應者
 - (3) 患部範圍過大者
 - (4) 傷口較深以及嚴重燙傷者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、長疹子

偶有出現以下嚴重症狀的可能。一旦出現，應立即接受醫生的診療

症狀的名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。

3. 如使用 5~6 天後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

對於切割傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨破腳、創傷面的殺菌、消毒

用法、用量

- 1 日數次，在患部噴射適量本劑

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
 - (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛，萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
 - (3) 本品僅限外用
 - (4) 使用前請搖勻
 - (5) 請從距離患部約 10cm 處噴射
 - (6) 請避免對同一部位連續噴射超過 1 秒，以免引發凍傷
- 用於臉部時，請勿直接噴射
 - 請勿橫向使用。

①如果傷口上附著有泥土，請開水龍頭讓大量的水充分沖洗	②出血較多時，用面紙輕輕擦拭掉	③從距傷口 10cm 左右處噴射
----------------------------	-----------------	------------------

成分、含量 100g 中

成分	含量	作用
十六烷基氯化吡啶水合物	0.08g	殺菌・消毒作用
馬來酸氯苯那敏	0.16g	抗組織胺作用(止癢)
鹽酸二丁卡因	0.08g	局部麻醉作用(鎮痛)
鹽酸萘甲唑啉	0.08g	止血作用

添加物：矽氧樹脂、LPG。

保管與使用相關注意事項

- (1) 請確實蓋緊瓶蓋後，存放在避免陽光直射的涼爽之處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請避免接近火源
- 請勿置於車內、陽光直射的場所或暖氣器具（暖爐、暖風扇等）等物品附近，以免因溫度上升而引起破裂的危險
 - 請勿置於家中常使用水的地方或潮濕的場所，以免瓶身因生鏽而產生破洞、裂痕

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>