

第②类医药品

止痒消炎药 カブナース

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 请勿用于下列部位
 - (1) 水痘(水泡疮)、足癣、顽癣或化脓的患部
 - (2) 伤口处
 - (3) 眼睛及眼睛周围、粘膜(如, 口唇等)
2. 请勿大面积用于面部
3. 请勿长期连续使用

咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - (1) 正在接受医治疗的人
 - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - (3) 有药物过敏史的人
 - (4) 患部面积大的人
 - (5) 患部不干爽及溃烂严重的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀
皮肤(患部)	足癣·顽癣等白癣、痤疮、化脓症状、持续性刺激感

3. 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

接触性皮炎、瘙痒、汗疹、湿疹、皮炎、冻疮、蚊虫叮咬、荨麻疹

用法、用量

请每天数次, 取适量涂于患部

〈用法与用量相关的注意事项〉

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用清水或温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (4) 本品仅限外用
- (5) 涂抹药剂后，请勿用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖患部

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
醋酸地塞米松	0.025g	抑制炎症，消除瘙痒、红肿
盐酸苯海拉明	1.0g	抑制瘙痒
利多卡因	0.5g	快速止痒
甘草酸	0.1g	消除红肿
异丙基甲基苯酚	0.1g	抑制杂菌

辅料：羟丙甲纤维素、羟乙基纤维素、乙醇、己二酸二异丙酯、聚山梨酯 80、丙二醇、二氧化硅、pH 调节剂

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
 - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
 - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
 - (4) 请不要靠近火源（本品为含乙醇物质）
- 本液体会损伤/污染塑料制品（眼镜框、梳子、马桶圈等）、化纤类衣物、木材（油漆油漆家私、床等）、皮革等制品，故请留意

严禁烟火

第二石油类 危险等级III

含乙醇物质 水溶性

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>